

# Rettet das Huhn e.V.

Vermittlung „ausgedienter“ Legehennen

---



## BEHANDLUNG BEI KLOAKEN- / LEGEDARMVORFALL

---

**Ein Kloaken- / Legedarmvorfall ist einfach behandelbar und absolut KEIN Grund, ein Huhn einzuschläfern!!!**

1. Erstbehandlung bei schlimmer Entzündung (weit vorgefallen, dunkelrot, blutig, angepickt) für ca. 1 Woche; durchzuführen morgens und abends:

- **erst mal separat von den anderen setzen** (und zwar so lange, bis der Legedarm wieder dauerhaft drin ist, da sonst die Gefahr besteht, dass die anderen Hühner daran rumpicken)
- Kloake vorsichtig mit Wattepad und vorher abgekochtem lauwarmen Wasser reinigen (nur wenn verschmutzt, sonst nicht!). Ggf. auch mit Kot verklebte Federn in dieser Region mit der Schere entfernen.
- morgens und abends mit Zinkspray (Raiffeisenmarkt/Landhandel) einsprühen
- einen Tierarzt aufsuchen, um die Entzündung antibiotisch zu behandeln (Baytril<sup>®</sup>); ggf. können auch Entzündungshemmer verabreicht werden.

Nach der Erstbehandlung weiter mit der eigentlichen Behandlung, siehe 2.!!!

**2. Behandlung Kloaken- / Legedarmvorfall ohne Vorliegen einer akuten Entzündung bzw. Verletzung des Legedarmendstücks (sonst s.o. 1.); durchzuführen morgens und abends:**

- **erst mal separat von den anderen setzen** (und zwar so lange, bis der Legedarm wieder dauerhaft drin ist, da sonst die Gefahr besteht, dass die anderen Hühner daran rumpicken)
- Kloake vorsichtig mit Wattepad und vorher abgekochtem lauwarmen Wasser reinigen (nur wenn verschmutzt, sonst nicht!). Ggf. auch mit Kot verklebte Federn in dieser Region mit der Schere entfernen.
- Einweghandschuhe anziehen (gibt's im Aldi), vorgestülpte Kloake sanft mit Melkfett/Vaseline einreiben und ganz vorsichtig mit dem kleinen Finger oder Zeigefinger zurückführen (nach innen drücken)
- als letztes kommt der wichtigste Teil: vorher abgekochtes aber EISKALTES Wasser mit einer 6ml Spritze (OHNE Nadel) bis zu 3 mal hintereinander in die Kloake spritzen! (Dadurch kontrahiert die Muskulatur, zieht sich zusammen und wird wieder trainiert.)
- abschließend den Afterbereich mit Zinkspray (Raiffaisenmarkt/Landhandel) einsprühen

Diese Behandlung so lange fortsetzen, bis die Kloake / der Legedarm von alleine dauerhaft wieder drin bleibt (das kann schnell gehen, kann aber auch mehrere Wochen dauern)!





Ein Kloakenvorfall beruht lediglich auf einer Erschlaffung der Muskulatur und ist, wie oben beschrieben, super behandelbar und das Huhn kann auch später wieder Eier legen, ohne das ein erneuter Vorfall auftritt!

**Auf keinen Fall das Huhn einschläfern lassen, auch wenn ein (hühnerUNerfahrener) Tierarzt dazu raten würde!**

---

Verwendung der Bilder mit freundlicher Genehmigung von Melani Nolte  
([www.lachshuhnzucht-herne.de](http://www.lachshuhnzucht-herne.de)).

Zusammengestellt von K. Tiepelmann & E. M. Ernst \* Rettet das Huhn e.V. \* Stand: Juni 2015  
Dieses Dokument hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt keinen Tierarztbesuch.

**Kontakt für weitere Fragen rund um die Hühnerhaltung: [marco@rettetdashuhn.de](mailto:marco@rettetdashuhn.de)**

---

Ein Tier zu retten verändert nicht die ganze Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses eine Tier. **Rettet das Huhn e.V.**